GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

Viceministerio de Salud Colectiva
Dirección de Epidemiología

Alerta epidemiológica ante la declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre el brote de viruela símica como emergencia de importancia internacional

La MPOX (viruela símica) es una zoonosis viral causada por un virus que pertenece al género Orthopoxvirus, este incluye al virus variola (causante de la viruela). La viruela símica se caracteriza por erupción o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. [1]

Resumen de la situación

El 14 de agosto de 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en vista del aumento de casos de viruela símica o MPOX en la República Democrática del Congo (RDC) y en un número creciente de países en África declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005). El Comité de Emergencias del RSI integrado por expertos independientes informó a la OMS que consideran que el incremento de casos de MPOX es una ESPII, con potencial para propagarse a más países de África y posiblemente fuera del continente.

Esta determinación de ESPII es la segunda en dos años relacionada con MPOX. MPOX se detectó por primera vez en humanos en 1970, en la RDC. La enfermedad se considera endémica en países de África central y occidental.

En julio de 2022, el brote en varios países de MPOX fue declarado ESPII ya que se propagó rápidamente a través del contacto sexual en una serie de países donde el virus no se había visto antes. Esa ESPII se declaró finalizada en mayo de 2023 después de un descenso sostenido de los casos a nivel mundial.

Desde el 1 de enero de 2022, 116 Estados Miembros de las 6 regiones de la OMS han notificado casos de MPOX. Hasta el 30 de junio de 2024, se habían notificado a la OMS un total de **99,176 casos confirmados en laboratorio** y **535 casos probables**, incluidas **208 muertes**. [2]

En los últimos seis meses, el número de casos notificados mensualmente ha disminuido sustancialmente desde el pico mundial de 30.721 casos observado en agosto de 2022.

En los últimos seis meses (del 1 de enero al 30 de junio de 2024):

- En promedio, a nivel mundial, se han observado 866 casos mensualmente.
- La región más afectada fue la región de África, donde se han notificado 1,854 casos y 13 muertes. Le siguen la región de las Américas (1,812 casos, 3 muertes) y la región de Europa (826 casos, 3 muertes). [2]

Figura 1. Curva epidémica mostrada por mes para los casos notificados hasta el 30 de junio de 2024.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

Viceministerio de Salud Colectiva
Dirección de Epidemiología

Alerta epidemiológica ante la declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre el brote de viruela símica como emergencia de importancia internacional

Contexto de la República Dominicana

El país hasta la semana epidemiológica 33-2024 se han notificado 8 casos confirmados de MPOX. El último caso registrado fue en abril 2024. Sin embargo, en respuesta a la declaración de emergencia emitidas por la OMS/OPS, se ha intensificado la vigilancia epidemiológica para identificar posibles casos de esta enfermedad. De acuerdo con el comportamiento presentado MPOX en RD no ha demostrado circulación comunitaria.

Recomendaciones

A partir de las recomendaciones compartidas por la OMS/ OPS exhortamos a:

- Los **Servicios de Salud**, notificar todo evento inusual posiblemente relacionado a MPOX, de acuerdo con la definición de caso establecida para esta enfermedad. Es importante hacer el diagnostico diferencial de la varicela, el sarampión, las infecciones bacterianas de la piel, la sarna, el herpes, la sífilis, otras infecciones de transmisión sexual y las alergias asociadas a los medicamentos.
- Ante la presencia der casos sospechosos, probables y/o confirmados deberán implementar medidas apropiadas de prevención y control de infecciones (PCI), pruebas para confirmar el diagnóstico, manejo sintomático seguimiento y tratamiento de complicaciones y condiciones graves.
- **Las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS)** fortalecer la vigilancia epidemiológica para la detección temprana y notificación oportuna de casos.
- **A la población general,** Evite el contacto directo, de piel a piel, con personas que tengan un sarpullido que se parezca al de la viruela símica.
- Evite el contacto con los objetos y materiales que una persona con viruela símica haya usado.
- Lávese las manos a menudo con agua y jabón o use un desinfectante de manos a base de alcohol, especialmente antes de comer o tocarse la cara y después de ir al baño.
- Si estuvo de visita en África Occidental o Central, manténgase atento a la aparición de síntomas de viruela símica por 21 días a partir de la fecha de su última exposición. Si tiene síntomas, como sarpullido, consulte a un proveedor de atención médica.
- La viruela símica se puede transmitir mediante las relaciones sexuales o besos y abrazos, evite contacto con directo con una persona sospechosa de esta enfermedad.

Referencias bibliográficas:

1. Mpox (Viruela Símica) Organización Panamericana de la Salud. Disponible en: https://www.paho.org/es/mpoxenfermedad
2. Brote de Mpox (viruela del mono) 2022-24: Tendencias mundiales. Organización Panamericana de la Salud. Disponible en: https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/